

# Brûlure ancienne ulcérée.

Quel est le geste idéal et obligatoire devant une Brûlure ancienne ulcérée.



Brûlure ancienne ulcérée.

Une biopsie, des biopsies ou une surveillance?

**Conduite pratique (solution)**

**Conduite pratique (solution)**

Des biopsies profondes et multiples. C'est un carcinome épidermoïde sur Brûlure ancienne ulcérée.

C.R.N : 13602/15

Médecin demandeur :

Dr. DOUIED.

RC : ulcération sur brûlure ancienne, suspicion d'un carcinome spinocellulaire.

### Biopsie cutanée

Les 4 fragments de 0,5cm chacun communiqués sont revêtus en surface d'un épiderme acanthosique et papillomateux mais aux noyaux réguliers surmonté d'une couche de kératine le plus souvent parakératosique avec globes cornés.

Le peu de derme visible est fibreux riche en éléments inflammatoires mononucléés.

### CONCLUSION :

-Tissu cutané siège d'un remaniement inflammatoire chronique avec acanthose et parakératose épidermique sans signe de malignité sur ces prélèvements.

-Si discordance avec la clinique d'autres prélèvements sont nécessaires.



La limite opposée (inférieure) est saine et située à 6mm.  
La limite externe (repérée par 1 fil) est saine et située à 7mm.  
La limite opposée (interne) est saine et située à 12mm.  
Le plan profond est sain et situé à 1mm.

### CONCLUSION.///

Carcinome épidermoïde bien différencié, infiltrant et kératinisant mesurant 9x5,5cm.  
Les limites d'exérèse chirurgicale latérales sont saines.  
La plus proche (limite inférieure) est saine et située à 6mm.  
Le plan profond est sain et situé à 1mm.