

# Tumeur pédiculée du sourcil.

Cet homme consulte pour une Tumeur pédiculée du sourcil.



Tumeur pédiculée du  
sourcil.

Que faire?

## Conduite pratique (solution).

Biopsie exérèse pour anapath. Il s'agit d'un épithélioma



basocellulaire

**Informations cliniques :** Tumeur pigmentée pédiculée. CBC ? Kyste ?  
Fibrome ?

**COMPTE RENDU**

**Macroscopie :**  
En formol, on a reçu un fragment pédiculé mesure 1,4cm de grand axe de couleur beige.

**Histologie :**  
Le prélèvement reçu fragmenté, visualise du tissu cutané et sous-cutané, infiltré au niveau de tout le derme par une prolifération tumorale nodulaire, bien limitée, faite de travées, de boyaux et de massifs cribriformes au sein d'un stroma fibreux, riche en lympho-plasmocytes. Les cellules sont de type basaloïde organisées en palissades périphériques avec des fentes de rétractions. Les noyaux sont modérément atypiques, les figures de mitoses sont nombreuses. Certaines cellules sont chargées en pigments mélaniques. Quelques boyaux comportent au centre une différenciation épidermoïde, les cellules deviennent globuleuses et clairifiées. La tumeur ulcère l'épiderme en regard, s'étend jusqu'à l'hypoderme. Les tranches de section sont saines.

**CONCLUSION :**

Aspect morphologique en faveur d'un carcinome basocellulaire nodulaire métatypique et pigmenté de l'arcade sourcilière.

Les tranches de section sont intégrées.

